



発行所 鹿児島市秘書課 編集人 藤山良弘 発行人 南日本新聞社印刷局

市の現勢 (7月1日) 人口 141,901 男女計 156,303 世帯数 298,204 産業構成 第1次産業 14,200 第2次産業 21,800 第3次産業 53,150 分類不能 5,550

市政だよりへ この市政 市政だよりへ この市政 市政だよりへ この市政

小児マヒの予防と対策

生ワクチンを無料配付

ハエの駆除と手洗いを 六才以下に注意

各地で小児マヒ患者が発生し、子供を持つ親たちを心配させています。幸い鹿児島市では、七月二十日現在、五名の患者しか出ていませんが、いつ大流行するかわかりません。そこでこの小児マヒの流行期にそなえて、その予防と対策を考えてみましょう。

小児マヒには 二つの型 小児マヒには、脳性小児マヒと、せき髄性小児マヒの二つがあります。脳性小児マヒは、生れつきのものが多く、伝染病ではありません。発病の原因は、胎児の運動が不自由となり、手足の運動が不自由となります。

三才までが最も 年もあぶない 小児マヒにかかりやすい年齢は、〇才から三才までといわれています。厚生省の調査によると、昭和三十四年の全国患者数の中、〇才が十六%、一才が四%、二才が十五%となっており、また、全体が八五%が〇才から四才までの患者となっています。季節的には六月から九月までの間が流行期で中でも八月が最も多く発生しています。なお、死亡するのは、患者の二%位にすぎ、その原因は呼吸器によるものが一番多くなっています。


予防と対策 小児マヒのウイルスは、ふん便の中にいるわけですから、用後は必ず手を洗ってください。また、食事の前や、外出から帰った時は、必ず手を洗いをしてください。また、ハエやゴキブリ(アマメ)は、便の中に入りますので、こまめに掃除をしましょう。アマメが食物につかないように工夫するとともに、これを徹底的に駆除する必要があります。



小児マヒの病原体は、普通の細菌よりも、さらに小さいウイルスという病原体です。感染の経路は、セキリなどと同じで、ふん便から口を通じて入ります。すなわち、用後の手洗いの不十分な場合とか、ハエやゴキブリ(アマメ)などによって、食物と共に運ばれます。また時にはインフルエンザのように飛沫感染によってもつります。

症状 高熱とカゼに似た症状 小児マヒにかかると、数日から三週にわたって、高熱とカゼに似た症状があらわれます。熱は、38度以上、40度以下に達し、数日から一週間続きます。これは早いほど長いといわれていますが、何より保護者のしんぱり強い努力が必要で、

生ワクチン服用の心得 申込みは当日会場へ 生ワクチン服用の心得 申込みは当日会場へ



(市立病院 届いた蚊の肺)

生ワクチン配付日程 7月27日 吉野小 吉野町 7月28日 清水小 清水町 7月29日 草野小 草野町 7月30日 伊敷小 伊敷町 8月1日 武田小 武田町 8月2日 荒田小 荒田町 8月3日 宇宿小 宇宿町 8月4日 八幡小 八幡町 8月5日 高池小 高池町 8月6日 黒神小 黒神町 8月7日 山下小 山下町

飲む時の注意 ワクチン配付の会場では、医師が予防接種をしますが、つきのような方法で注意してください。

飲む方法 生ワクチンは、年令によってポンポンかシロップをあてられますが、医師の指示によって会場で飲むことになっています。

費用と年令 生ワクチンの配付を受けるには、費用は一切ありません。八月一杯中止です。

動物園で野外学習 8月6日 世界野生哺乳動物の話 8月13日 鹿児島県の動物物の話 8月20日 魚の飼い方と近海魚の話 (市内小中学生先着100名)

あいご映画会 野球少年 まんが太郎、こねこのスタジオ 宿題、夢見童子、風小僧、ニュース、外 第一回 7月27日 29日 第二回 8月3日 5日 第三回 8月10日 12日 中央公民館

夜の城山納涼バス 8月5日~9月3日毎週土・日曜 (始発) 高見馬場 午後6時半 (20分置) (終発) 高見馬場午後9時 城山 午後9時半 (停留所) 天文館、朝日通、照国神社、大学病院 (料金片道) 小人 10円 大人 15円 交通局

